

DIARRHÉE ÉPIDÉMIQUE

DÉFINITION	* Infection intestinale. Selles liquides et fréquentes chez au moins 2 enfants du même groupe.
PERIODE DE CONTAGIOSITÉ	* Variable. Correspond habituellement à la phase aigüe de la maladie.
MODES DE TRANSMISSION	* Par contact direct : peau à peau, bouche à bouche, bouche à plaie... * Par contact indirect : entrant en contact avec un objet ou des mains contaminés. * Risque plus grand si la diarrhée survient chez des enfants aux couches.
SYMPTÔMES	* Nausées et vomissements. * Douleurs abdominales. * Diarrhée et fièvre.
TRAITEMENTS	* Faire boire souvent et peu à la fois des solutions d'hydratation orale. * Diriger vers le médecin si : - il y a présence de sang dans les selles - si accompagné de vomissements fréquents - si fièvre élevée et persistante
PRÉVENTION	* Renforcer les mesures d'hygiène, en particulier en ce qui concerne le lavage des mains, les changements de couches et la désinfection des objets, des surfaces et des locaux.
EXCLUSION	* Si l'enfant est trop malade pour participer aux activités du groupe. * Si présence de fièvre. * Si l'enfant a eu deux vomissements ou plus au cours des 24 dernières heures. * Si présence de sang ou de mucus dans les selles. * Si les selles débordent de la couche. * Si l'enfant propre est incapable d'utiliser les toilettes à chacune de ses selles.