

STREPTOCOQUE ET SCARLATINE

DÉFINITION	<ul style="list-style-type: none">* Infection de la gorge causée par la bactérie Streptocoque du groupe A.* S'il y a une éruption cutanée caractéristique, il s'agit généralement d'une scarlatine.
PERIODE DE CONTAGIOSITÉ	<ul style="list-style-type: none">* Jusqu'à 24 heures après le début du traitement antibiotique.* Si l'infection n'est pas traitée, de 2 à 3 semaines.
MODES DE TRANSMISSION	<ul style="list-style-type: none">* Par goutellettes : en toussant, en éternuant, en parlant.* Par contact direct : peau à peau, bouche à bouche, bouche à plaie...* Par contact indirect : entrant en contact avec un objet ou des mains contaminés.
SYMPTÔMES	<ul style="list-style-type: none">* Fièvre, mal de tête, mal de gorge.* Nausées, vomissements, perte d'appétit.* Enflure des ganglions du cou et rougeur de la gorge. <p>S'il y a, en plus, une langue framboisée et une éruption cutanée rugueuse atteignant le cou, la poitrine et les plis des aisselles, des coudes, des aines et des genoux, il peut s'agir d'une scarlatine</p>
TRAITEMENTS	<ul style="list-style-type: none">* Antibiotique par la bouche. <p>Acétaminophène au besoin.</p> <ul style="list-style-type: none">* Repos, faire boire plus de liquide, diète molle et froide.
PRÉVENTION	<ul style="list-style-type: none">* Renforcer l'hygiène respiratoire. <p>Renforcer les mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces, y compris les jouets.</p> <ul style="list-style-type: none">* S'assurer que le diagnostique a été posé par un médecin.
EXCLUSION	<ul style="list-style-type: none">* Exclure l'enfant jusqu'à 24 heures après le début du traitement.* Exclure l'enfant jusqu'à ce que son état lui permette de participer aux activités du groupe.